

EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH

Makrogolis 3350

24 paketėlių po 13,3 g

Naudingas esant vidurių užkietėjimui

1. Medicinos priemonės identifikacija, sudėtis ir paskirtis

EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH yra vidurius laisvinanti medicinos priemonė, kuri, veikdama osmosiškai, natūraliu būdu reguliuoja vidurius. Ji nėra nei absorbuojama, nei fermentuojama virškinimo trakte, nedirgina gleivinės ir yra pašalinama su išmatomis. EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH ypač tinka esant lėtiniam vidurių užkietėjimui ir retkarčiais pasitaikančiam tuštinimosi sutrikimui. EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH pasižymi vandenį pritraukiančiomis savybėmis, todėl suminkština išmatas, palengvina jų pašalinimą, nesukeldama spazmų, pilvo skausmo ar pavojingos būklės atvejų. Jos veiksmingumas laikui bėgant nesumažėja.

1.1 Sudedamosios dalys

Kiekviename paketėlyje yra 13,125 g makrogolio 3350. Pagalbinės medžiagos: silicio dioksidas, kvapiosios medžiagos, natrio sacharinas.

2. Pakuotė

EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH yra milteliai paketėliuose, skirti geriamajam tirpalui ruošti.

Dėžutėje yra 24 vienos dozės paketėlių po 13,3 g.

3. Dozė ir vartojimo būdas

Suaugusieji ir vyresni nei 12 metų vaikai: 1 paketėlis (13,3 g) 1–3 kartus per dieną. Ilgai vartojant, galima sumažinti dozę iki 1–2 paketėlių per dieną. Atplėškite paketėlį ir ištirpinkite jo turinį 125 ml vandens (apie 1 stiklinė negazuoto vandens).

4. Kontraindikacijos

Nevartokite EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH esant vienai iš šių būklių:

- žarnyno susiaurėjimas;
- žarnyno perforacija;
- uždegiminė žarnų liga (pavyzdžiui, Krono liga, opinis kolitas).

Nevartoti esant žarnyno nepraeinamumui

Kadangi nėra nustatytų duomenų apie jo poveikį nėštumo ir žindymo laikotarpiu, EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH vartokite tik tada, kai tai būtina, ir pasitarę su gydytoju.

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozės koreguoti nereikia. Gydomo su EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH trukmė neturi viršyti 2 savaičių. Esant poreikiui, gydymą galima pratęsti. Ilgai vartoti gali reikėti esant vidurių užkietėjimui, kuris sunkiai pasiduoda gydymui, ir (arba) lėtiniam vidurių užkietėjimui. Tokį vidurių užkietėjimą gali sukelti skausmą malšinantys vaistai (opiodai) ir vaistai, skirti Parkinsono ligai gydyti (anticholinerginiai vaistai), arba tokios ligos, kaip išsėtinė sklerozė ar Parkinsono liga, gali sukelti vidurių užkietėjimą, kuris sunkiai pasiduoda gydymui.

5. Šalutinis poveikis

Nėra jokių pranešimų apie šalutinį poveikį, vartojant gydomajam poveikiui užtikrinti reikalingomis dozėmis.

Kartais gali pasireikšti virškinimo trakto sutrikimai, pilvo gurgimas, skausmas, pykinimas ir lengvas viduriavimas (ypač pradžioje). Retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų (bėrimas, dilgėlinė). Pasireiškus bet kurioms nepageidaujamoms reakcijoms, net ir neišvardintoms, pasitarkite su gydytoju. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Jei pamiršote išgerti vieną dozę, negerkite dvigubos dozės, bet palaukite ir gerkite kitą.

6. Perdozavimas

Perdozavus gali pasireikšti toks poveikis: stiprus skausmas, pilvo pūtimas, viduriavimas ir vėmimas, dėl kurių gali sutrikti elektrolitų pusiausvyra. Atsiradus nepageidaujamoms reakcijoms, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

7. Sąveika su vaistais

Iki šiol nėra žinomos sąveikos su vaistais, tačiau dėl makrogolio osmosinės energijos ir tranzito virškinimo traktu greičio padidėjimo preparatą reiktų vartoti praėjus mažiausiai 2 valandoms nuo vaistų (taip pat ir homeopatinių vaistų) ar maisto papildų vartojimo, nes jis gali neigiamai paveikti jų veiksmingumą. Tačiau prieš pradėdami vartoti EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH, pasitarkite su gydytoju dėl kito tuo metu vykdomo gydymo.

8. Laikymas

Laikykite EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH sausoje, nuo tiesioginių šilumos ar šviesos šaltinių apsaugotoje vietoje: atplėškite paketėlį tik prieš vartojimą. Nevartoti, jei paketėliai pažeisti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti priemonę žemesnėje nei 25 °C temperatūroje.

9. Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Neduokite produkto jaunesniems nei 12 metų vaikams. Nėščios ar žindančios moterys turi vartoti EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH tik pasitarusios su gydytoju. Rekomenduojama neviršyti rekomenduojamų kiekių, nes didesnės dozės gali sukelti netikėtų šalutinių poveikių. Vartojant ilgiau nei 30 dienų, gydymą EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH rekomenduojama nutraukti bent 3–5 dienoms. Nevartoti, jei pasireiškė produkto netoleravimo simptomai. Nevartoti esant padidėjusiam jautrumui sudėtinėms dalims ir polietilenglikoliui. Kiekvienas paketėlis yra vienkartinis ir turi būti atplėštas tik prieš vartojimą.

10. Galiojimo laikas

Nevartokite priemonės, pasibaigus ant pakuotės nurodytam galiojimo laikui.

Galiojimo laikas taikomas produktui, kuris laikomas nepažeistoje pakuotėje.

11. Šalinimas

Priemonė, kurios galiojimo laikas pasibaigęs, turi būti tvarkoma pagal vietos subjekto vadovo atliekų tvarkymo taisykles.

Jokiu būdu neišmeskite produkto ar jo pakuotės į aplinką.



 SIIT S.r.l., Via Ariosto 50/60,
Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

Platintojas:

UAB „Indralife“

J. Savickio g. 4, 01108 Vilnius,
Lietuva

Tel. +37067867467

Paskutinė peržiūra: 2015 m. gegužės mėn.