

EFFECOL PREP

Epsilon Health

Makrogolis 3350 ir simetikonas

Milteliai geriamajai suspensijai, skirtai veiksmingam žarnyno valymui prieš endoskopinius tyrimus.

INDIKACIJOS

„Effecol Prep Epsilon Health“ yra miltelių pavidalo medicinos priemonė geriamajai suspensijai, skirtai veiksmingam žarnyno valymui prieš endoskopinius tyrimus arba esant klinikinėms būklėms, dėl kurių reikia visiškai išplauti ir išvalyti žarnyną. Siekiant tiksliai diagnozuoti, būtina pašalinti kietąsias liekanas iš storosios žarnos.

VEIKIMO MECHANIZMAS

„Effecol Prep Epsilon Health“ sudėtyje yra makrogolio 3350 – inertiškos medžiagos, kuri nėra absorbuojama virškinimo trakte, nedirgina gleivinės, nesifermentuoja ir yra pašalinama iš virškinimo trakto nepakitusi. Macrogolis 3350 pasižymi vandenį pritraukiančiomis savybėmis, t. y. sugeria didelį vandens kiekį, todėl suminkštėja išmatų masė ir skatinama peristaltika. Dėl putojimą stabdančio poveikio simetikonas mažina virškinimo trakto išsipūtimo pojūtį.

SUDĖTIS

Vieno paketėlio sudėtis: 60 g makrogolio 3350 ir 80 mg simetikono

Pagalbinės medžiagos: silicio dioksidas, kvapiosios medžiagos, natrio sacharinas

PAKUOTĖ

Dėžutėje yra 4 paketėliai

KONTRAINDIKACIJOS

„Effecol Prep Epsilon Health“ negalima vartoti šiais atvejais:

- žinomas padidėjęs jautrumas produktui;
- žarnyno susiaurėjimas ar nepraeinamumas;
- dinaminis žarnyno nepraeinamumas;
- ūmus ar sunkus kolitas;
- toksinis megakolonas;
- žarnos perforacija;
- gastrostazė;
- uždegiminės žarnų ligos, pavyzdžiui, opinis kolitas ir Krono liga;
- pacientai, sveriantys mažiau nei 20 kg arba jaunesni nei 2 metų amžiaus.

NĖŠTUMAS IR ŽINDYMO LAIKOTARPIS

Duomenų apie „Effecol Prep Epsilon Health“ vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu nėra. Taigi, rekomenduojama vartoti tik pasitarus su gydytoju.

SAVEIKA SU KITAIŠ VAISTAIS

„Effecol Prep Epsilon Health“ sutrumpina tranzito žarnynu laiką, kartu ir tuo pačiu metu vartojamų vaistų absorbciją. Nevartokite jų kartu: išgėrę vaistus, palaukite bent 2 valandas prieš vartodami „Effecol Prep Epsilon Health“.

Jei vartojate antikoagulantus, antitrombocitinius vaistus ar vaistus nuo diabeto, pasitarkite su gydytoju arba endoskopijos centro specialistais dėl galimo dozės pakeitimo.

DOZĖ IR VARTOJIMO BŪDAS

Visiškam žarnyno išvalymui prieš kai kuriuos diagnostinius tyrimus (storosios žarnos radiologiniai ar endoskopiniai tyrimai, pilvo ultragarsiniai tyrimai) ir esant kitoms klinikinėms būklėms, atidžiai laikykitės centro, kuriame bus atliekamas endoskopinis tyrimas, specialistų pateiktų nurodymų. Paprastai tai reiškia, kad likus kelioms dienoms iki tyrimo reikia laikytis nustatytos dietos.

Norėdami ekstemporaliai paruošti geriamąją suspensiją, 2 paketėlių turinį supilkite į indą, pripilkite 1 litrą vandens, gerai suplakite, kad susidarytų vienalytis tirpalas. Paruoštą tirpalą reikia išgerti per 1–2 valandas: galima gerti po 250 ml kas 10–15 minučių, kol išgersite pirmąjį litrą.

Sumaišykite su 500 ml vandens (pusė litro), kad iš viso gautumėte 1,5 l (1 litras preparato ir 500 ml vandens).

Maždaug po 1 valandos pakartokite paruošimą su kitais 2 paketėliais 1 litre vandens ir išgerkite taip, kaip aprašyta aukščiau (1 l preparato ir 500 ml vandens). Iš viso turite išgerti 3 litrus suspensijos.

Išgėrę pirmąjį litrą, pradėsite jausti žarnyno peristaltiką ir norą tuštintis. Palaipsniui išmatos bus vis skystesnės, kol išsiskirs skaidrus skystis be išmatų likučių. Tai rodo, kad valymas atliktas teisingai ir esate pasirengę atlikti tyrimą. Preparatas paprastai nesukelia pilvo diskomforto ir skausmo.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Geriamąją suspensiją reikia paruošti prieš pat vartojimą. Jei tirpalo nevartosite iš karto, jį reikia laikyti šaldytuve ir suvartoti per 24 valandas nuo paruošimo.

Į paruoštą tirpalą nedėkite jokių kitų ingredientų.

Simetikonas gali sutrikdyti kai kurių diagnostikos reagentų, pvz., gvajako dervos, poveikį.

NEPAGEIDAUJAMI REIŠKINIAI

Prieš tuštinimąsi gali pasireikšti skrandžio ir žarnyno sutrikimai, žarnyno garsai, pilvo skausmas, pykinimas; jei šie simptomai tampa intensyvesni, preparatą reikia vartoti lėčiau,

toku būdu simptomai susilpnės. Retais atvejais gali pasireikšti padidėjusio jautrumo ir alerginės reakcijos (odos bėrimas ir dilgėlinė). Jeigu pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą nepageidaujamą reiškinį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

LAIKYMAS


Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nevartoti produkto pasibaigus ant pakuotės nurodytam galiojimo laikui. Galiojimo data yra nurodyta ant maišelio ir dėžutės. Nevartoti produkto, jei maišelis yra atidarytas ar pažeistas. Laikyti produktą sausoje, nuo tiesioginių šilumos ar šviesos šaltinių apsaugotoje vietoje, <25 °C temperatūroje.

ŠALINIMAS

Priemonė, kurios galiojimo laikas pasibaigęs, turi būti tvarkoma pagal vietos subjekto vadovo atliekų tvarkymo taisykles.

Jokiu būdu neišmeskite produkto ar jo pakuotės į aplinką.

Paskutinė peržiūra: 2022 m. birželio mėn.



„SIIT S.r.l.“, Via Ariosto 50/60,
Trezzano sul Naviglio (MI), Italija

Platintojas:

UAB „Indralife“
J. Savickio g. 4, 01108 Vilnius,
Lietuva
Tel. +37067867467